○稲垣 江梨¹⁾、山下 賀容子¹⁾、建田 潮²⁾

1)一般財団法人 雑賀技術研究所、2)SCIEX

緒言

食物アレルギー分析法については、消費者庁により、定量検査法としてELISA法が、定性検査法としてPCR法やウエスタンブロット法が指定されている。しかし、ELISA法は、偽陽性や偽陰性の結果を生じる可能性があること、市販キットの対象が特定原材料とその他の数品目のみであること、また1回の検査で1品目のアレルギーに限られることから、食品中に含まれる複数のアレルギーを迅速かつ正確に検査する方法の確立が望まれている。**LC-MS/MSによるアレルギー分析**は、SCIEXが提案し、AOAC OMAを取得するなど注目されており、従来の分析方法に比べて、選択性が高く、高感度、迅速であるなどの利点がある。今回、**LC-MS/MSを用いた加工食品中の食物アレルギー一斉分析法**を検討し、その結果を報告する。

方法

1.標準液調製方法

標準用試料(市販の牛乳、卵、小麦、落花生、そば、えび、大豆)から、消費者庁通知法を参考に調製した。すなわち、卵の場合、新鮮卵1kgの卵殻を外し、均一にホモジナイズした後に凍結乾燥し、微粉碎したものを標準用試料とした。タンパク質の抽出には**相間移動溶解剤* (Phase Transfer Surfactant, PTS)**を用い、BCA法にて濃度を定量し、標準液とした。

2.試料調製方法

試料(市販シチュールウ:特定原材料不使用製品を含む)中のタンパク質をPTSにより抽出し、還元アルキル化の後、トリプシンを用いて消化し、固相カラムにてペプチドを精製した。添加試料は、抽出前に試料あたり10mg/kgになるよう、全ての標準液を加えて同様の処理を行った。

1.標準液調製方法

標準用試料(市販の牛乳等)

PTS溶液

- ・10mM SDC(デオキシコール酸ナトリウム)
- ・12mM SLC(N-ラウロイルサルコシン酸ナトリウム)
- ・Tris水溶液

加熱、超音波抽出

アセトン沈殿

限外濾過

図1:完成した標準液

BCA法にて濃度決定
標準液として使用

* PTSの特徴:酸性条件下で疎水性度が上昇することにより、酢酸エチルを用いた液液分配でPTSを除去できる。PTSには、タンパク質可溶性能の高い界面活性剤を用いる。

2.試料調製方法

試料(市販シチュールウ)

標準液添加 図2:シチュールウ
(試料あたり10mg/kg)

PTS溶液

加熱、超音波抽出

DTT
IAA
トリプシン

タンパク質の消化
一晚静置
酢酸エチル、TFA

PTSの除去

固相カラムで精製

LC-MS/MS

図3:PTS抽出
(遠心分離の前(左)後(右))

図4:PTS除去(酢酸エチル層を除去する前(左)後(右))

3.機器分析条件

HPLC: LC-30AD(島津製作所社製)
質量分析計: QTRAP5500
(SCIEX社製)

図5:測定機器

アプリケーション: vMethod Application for Multiple Allergen Screening in Food Matrices using LC-MS/MS; vMethod Application for Gluten Quantitation in Food Matrices using LC-MS/MS(SCIEX社製)
移動相: 0.1%ギ酸水、0.1%ギ酸アセトニトリル
分析カラム: InertSustain AQ-C18 1.9μm, 2.1 × 100mm(GL Sciences社製)
分析モード:ESI・ポジティブ、注入量:5μL

結果

4.シチュールの検討結果

作製した標準液を用いて、シチュールの食物アレルギー一斉分析を実施したところ、特定原材料不使用製品から、ピークは同定されなかった。乳・小麦・大豆を含む製品からは、対象ピークが同定された。同様に、添加試料において、対象アレルギー全てが同定できた。(図6)

—A:特定原材料不使用製品 —C:乳・小麦・大豆を含む製品
—B:Aに標準液添加(試料あたり10mg/kg) —D:Cに標準液添加(試料あたり10mg/kg)

乳

卵

小麦

落花生

そば

えび

大豆

図6:LC-MS/MSを用いた食物アレルギー一斉分析クロマトグラム(シチュール)

まとめ

近年LC-MS/MSを用いたアレルギー分析法がいくつか報告されているが、それらは市販標準品を使用していることが多く、特定のアレルギータンパク質を定量しており、通知法の定量値と異なる恐れがある。また、市販標準品の対象は、一部の品目に限られる。今回、通知法を参考にPTS法を用いて特定原材料および大豆のタンパク質抽出を行い、**品目毎に総タンパク質を含む標準液を作製し、シチュールのアレルギー一斉分析を行ったところ、対象品目のピークが同定できた。**ただし、一部の品目で、マトリクス効果により、ピーク強度が低くなった。今後は、マトリクス効果の検証や定量性の確認、直線性、再現性等について、検討する。将来的には、今回実施したアレルギー品目以外の、特定原材料に準ずるもの20品目まで拡大させ、分析法を確立していく。